

كلية طب الأسنان

تفاصيل البحث:

Cavernous haemangioma of the submandibular salivary gland :
Cavernous haemangioma of the submandibular salivary gland

عنوان البحث

Salivary gland haemangioma is more common in the parotid :
than in any other salivary gland. Parotid haemangioma is
onsidered to be the most common salivary gland tumour in
.infants, but is also occasionally encountered in adults

الوصف

: رسالة علمية

نوع البحث

Int. J. Oral Maxillofacial. Surg :

الناشر

Thursday, November 08, 2007 :

تاريخ الاضافة على الموقع

الباحثون:

البريد الالكتروني	المرتبة العلمية	نوع الباحث	اسم الباحث (انجليزي)	اسم الباحث (عربي)
ialhakeem@kau.edu.sa	دكتوراه	باحث	باحث	ابراهيم السيد محمد الحكيم
		باحث		مصطفى الخشاب

المرفقات:

الوصف	النوع	اسم الملف
	pdf	Cavernous.pdf

الصفحة الرئيسية <

عن الكلية <

الإدارة <

الشؤون التعليمية <

العيادات والمعامل <

الوحدات <

الدبلومات <

آخر الأخبار <

أسئلة متكررة <

المشاريع والبحوث العلمية <

الملفات <

دليل المنسوين <

المواد <

أبوم الصور <

مواقع مفضلة <

الجوائز والاعتمادات <

للإتصال بنا <

SHARE

English | الصفحة الرئيسية | اتصل بنا